

Kryteria włączenia do programu:

Leczenie stwardnienia rozsianego	
interferonem beta	octan glatirameru
<ul style="list-style-type: none">- wiek powyżej 16 roku życia,- rozpoznanie klinicznie stwardnienia rozsianego jest poprzedzone odpowiednio długą obserwacją neurologiczną- przynajmniej 2 rzuty w ciągu 2 ostatnich lat,- rozpoznanie postaci rzutowej SM oparte jest na kryteriach diagnostycznych McDonald (Polman i wsp. 2005); włącznie z badaniami rezonansem magnetycznym,- co najmniej 21 punktów wg punktowego systemu kwalifikacji,- pisemna deklaracja współpracy przy realizacji programu ze strony pielęgniarki środowiskowej obejmującej opieką pacjenta.	<ul style="list-style-type: none">- wiek powyżej 18 roku życia,- rozpoznanie klinicznie stwardnienia rozsianego jest poprzedzone odpowiednio długą obserwacją neurologiczną - przynajmniej 2 rzuty w ciągu 2 ostatnich lat,- rozpoznanie postaci rzutowej SM oparte jest na kryteriach diagnostycznych McDonald (Polman i wsp. 2005); włącznie z badaniami rezonansem magnetycznym,- co najmniej 21 punktów wg punktowego systemu kwalifikacji,- pisemna deklaracja współpracy przy realizacji programu ze strony pielęgniarki środowiskowej obejmującej opieką pacjenta. <p>A. pierwotne przeciwwskazania dla stosowania interferonów beta (wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych przeciwwskazań):</p> <ul style="list-style-type: none">- nadwrażliwość na interferon,- współtowarzysząca inna postać choroby,- zdekompensowana niewydolność wątroby (enzymy wątrobowe 2x powyżej normy),- zaburzenia czynności tarczycy (bez eutyreozy),- depresja nie poddająca się leczeniu,- padaczka,- przeciwwskazania wymienione w ulotce producenta leku. <p>lub</p> <p>B. niepowodzenie w leczeniu interferonem beta (zgodnie z punktem 3 A)</p> <p>lub</p> <p>C. nietolerancja interferonów beta (wystąpienie</p>

	<p>przynajmniej jednego z poniższych):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ostre reakcje nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny, skurcz oskrzeli, pokrzywka), - wzrost poziomu transaminaz (AspAT, AlAT > 2 x GGN) lub kliniczne objawy niewydolności wątroby, - wystąpienie leukopenii (< 3000), trombocytopenii, niedokrwistości, - objawy ciężkiej depresji, próby samobójcze, - padaczka, - wystąpienie zaburzeń czynności tarczycy (bez eutyreozy), - wieloogniskowe zmiany skórne.
--	--

Punktowy system kwalifikacji do leczenia stwardnienia rozsianego interferonem beta:

a) wiek chorego/chorej

16 (18*) - 40 lat	6 pkt.
40 - 60 lat	3 pkt.
powyżej 60 lat	1 pkt.

* w przypadku octanu glatirameru

b) czas trwania choroby

0 - 3 lat	6 pkt
3 - 6 lat	3 pkt.
6 - 10 lat	2 pkt.
powyżej 10 lat	1 pkt.

c) postać choroby

rzutowa bez objawów ubytkowych	5 pkt
--------------------------------	-------

d) liczba rzutów choroby w ostatnim roku

3 - 4/ rok	5 pkt.
1 - 2 /rok	4 pkt.
6 - 7 / rok	2 pkt.
rzadziej niż 1 x w roku	1 pkt.
częściej niż 7/ rok	0 pkt.

e) stan neurologiczny w okresie międzyrzutowym (przy rozpoczynaniu leczenia)

- objawy nieznacznie upośledzające układu ruchu (chory samodzielnie chodzący)

EDSS 0 – 2	6 pkt
EDSS 2 – 4	3 pkt
EDSS 4 – 5	2 pkt
EDSS >5	1 pkt